

# Gebrauchsinformationen: Arzneimittel und Alkohol

Jeder weiß es eigentlich: Arzneimittel sollen nicht mit Alkohol eingenommen werden. Auch soll kein Alkohol getrunken werden, wenn man Medikamente eingenommen hat und umgekehrt – Keine Medikamente einnehmen, wenn Alkohol getrunken wurde.

Es gibt nämlich eine große Anzahl von Wirkstoffen, die sich nicht mit Alkohol vertragen.

Beachtet man dies jedoch nicht, so kann die Leberschädigende Wirkung aller Arzneimittel massiv verstärkt werden.

Bei folgenden Mitteln sollte der Alkoholkonsum strengstens untersagt bleiben:

- alle Antiepileptika
- Schmerzmittel: Paracetamol und Acetylsalicylsäure
- Starke Schmerzmittel: Morphin und Tilidin
- alle Antidepressiva
- Muskelverspannungsmittel: Baclofen, Tetrazepam, Tizanidin
- alle Schlafmittel
- Antiallergika: Dimetinden, Diphenhydramin, Doxylamin, Clemastin und Meclocin
- Blutgerinnungshemmer: Warfarin
- Hustenstiller: Codein
- Antipilzmittel: Ketoconazol
- Magenmittel: Metoclopramid
- Tuberkulosemittel: Isoniazid
- Trichomonadenmittel und Magenmittel: Metronidazol
- Entzugsmittel Clomethiazol

Außerdem sollten Diabetiker ihren Alkoholkonsum generell einschränken, da dieser eine Stoffwechsellentgleisung begünstigt.

Eindeutige ID: #1125

Autor: admin

Letzte Änderung des Artikels: 2009-08-25 17:57